

**HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VITAMIN A MỞ RỘNG KẾT HỢP TẮY GIUN CHO TRẺ EM.****I. CHỈ ĐỊNH VÀ LIỀU DÙNG****1. Vitamin A**

- Trẻ từ 6-11 tháng tuổi: 100.000 đơn vị (nửa viên tương đương 3 giọt)
- Trẻ từ 12-60 tháng tuổi: 200.000 đơn vị (1 viên)
- Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc bệnh có nguy cơ thiếu vitamin A (mắc các bệnh sỏi, tiêu chảy kéo dài, viêm hô hấp cấp, suy dinh dưỡng nặng)
- Bà mẹ sau khi sinh con trong vòng một tháng sau đẻ: 200.000 đơn vị (1 viên).

2. Thuốc tẩy giun:

Trẻ từ 24 tháng đến 60 tháng tuổi uống Albendazole 400 mg (hoặc Mebendazole 500mg).

Triển khai phối hợp bổ sung Vitamin A và tẩy giun cho trẻ em theo Hướng dẫn được ban hành cùng Quyết định số 3893/QĐ-BYT ngày 11/10/2007.

II. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Trẻ đang đau bụng, sốt cao ($>38,5^{\circ}\text{C}$).
- Đang bị các bệnh mạn tính như: tâm thần, suy thận, tim, gan, hen phế quản.
- Có tiền sử dị ứng với các thành phần của thuốc.

III. XỬ TRÍ VÀ THEO DÕI

- Đối với các trường hợp uống thuốc giun cần theo dõi 48 giờ sau khi uống. Các trường hợp có triệu chứng đau bụng cần theo dõi tại trạm y tế xã. Nếu có các triệu chứng tắc ruột do quá nhiều giun cần chuyển ngay đến bệnh viện điều trị.
- Tổ chức trực theo dõi tại các cơ sở y tế trong thời gian triển khai cho trẻ uống thuốc theo quy định, kịp thời xử trí và báo cáo tuyến trên.

**NGUYÊN TẮC LẬP DANH SÁCH TRẺ UỐNG THUỐC****Lập danh sách trẻ từ 6-60 tháng:**

ĐỢT I (tháng 6): Trẻ sinh từ ngày 15/05 cách đây 5 năm đến 15/12 năm vừa qua.

ĐỢT II (tháng 12): Trẻ sinh từ ngày 15/11 cách đây 5 năm đến 15/06 năm nay.

Ví dụ:

- Đợt I năm 2010: Trẻ sinh từ 15/05/2004 - 15/12/2010.

- Đợt II năm 2010: Trẻ sinh từ 15/11/2004 - 15/06/2010.

Lập danh sách trẻ từ 24-60 tháng:

ĐỢT I (tháng 6): Trẻ sinh từ ngày 15/05 cách đây 5 năm đến 15/06 cách đây 2 năm.

ĐỢT II (tháng 12): Trẻ sinh từ ngày 15/11 cách đây 5 năm đến 15/12 cách đây 2 năm.

Ví dụ:

- Đợt I năm 2010: Trẻ sinh từ 15/05/2004 - 15/06/2010.

- Đợt II năm 2010: Trẻ sinh từ 15/11/2004 - 15/12/2010.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẠI CÁC ĐIỂM UỐNG THUỐC