

MUỐN KHÔNG BỊ NHIỄM GIUN CẦN PHẢI:

Đi đại tiện vào hố xí
hợp vệ sinh.



Không nên ăn rau sống.
Khi ăn các loại rau quả
cần rửa sạch và gọt vỏ.



Thường xuyên
cắt ngắn móng tay.



Rửa sạch tay
trước khi ăn
và sau khi đại tiện.



Đi giày dép
thường xuyên
nhất là khi đi ra vườn.



TẨY GIUN NHƯ THẾ NÀO:

Cho trẻ uống Mebendazole 500mg hoặc
Albendazole 400mg 1 viên, 6 tháng 1 lần



Hãy hỏi ý kiến bác sĩ đối với các trường hợp:

- Dưới 2 tuổi
- Đang có bệnh cấp tính
- Đã từng dị ứng thuốc


Thực hiện phòng chống giun đường ruột :

Trẻ lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo


Có thể:

Uống Mebendazole 500mg hoặc Albendazole 400mg, 1 viên,
6 tháng 1 lần


KHÔNG BỊ NHIỄM GIUN TRẺ SẼ KHỎE MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN TỐT



TẠI SAO CHÚNG TA BỊ NHIỄM GIUN:




HẬU QUẢ CỦA NHIỄM GIUN:




- Suy dinh dưỡng:
gầy còm, sút cân, chậm lớn...
- Thiếu máu:
đau đầu, xanh xao, mệt mỏi.



Giảm thông minh, học kém...
Lười vận động.



Chán ăn.



- Đau bụng vòng quanh rốn, buồn nôn, nôn...
- Rối loạn đi ngoài:
táo bón, lâ lỏng...
- Giun chui ổ mật,
tắc ruột, thủng ruột do giun.



Giun đũa (qua miệng)
sống trong ruột non



Giun tóc (qua miệng)
sống trong ruột già



Giun móc (chui qua da)
sống trong tá tràng



Giun kim
sống tại hậu môn